Додаток 2
до реєстраційного посвідчення
АВ-09685-01-24

УРОЛІК
(суспензія для перорального застосування)
листівка-вкладка

Опис
Суспензія від світло-жовтого до коричневого кольору зі специфічним запахом складників.

Склад
1 мл препарату містить діючі речовини (мг):
толокнянки (мучниці) листя екстракт сухий (10:1) – 5,0;
хвоща трави екстракт сухий (10:1) – 5,0;
пол-пали (ерви шерстистої) екстракт сухий (10:1) – 25,0;
журавлини плодів екстракт сухий (10:1) – 20,0.
Допоміжні речовини: калію сорбат, натрію бензоат, кислота лимонна, ксантанова камідь, гліцерин, вода очищена.

Фармакологічні властивості
АТС-vet класифікаційний код: QG04 Урологічні.
УРОЛІК має діуретичну, антибактеріальну, протизапальну, аналгетичну, репаративну, антиоксидантну, мембраностабілізуючу, судинозміцнюючу, простатопротекторну дію, сприяє розчиненню каменів (крім оксалатів) і виведенню піску з нирок і сечового міхура.
Екстракт толокнянки (мучниці), що входить до складу УРОЛІКУ, має протизапальну і сечогінну дію. Антимікробні і антисептичні властивості мучниці забезпечуються фенолглікозидом арбутином, який розщеплюється в організмі з утворенням гідрохінону. Гідрохінон, виділяючись з сечею через нирки, підсилює сечовиділення і має протимікробну дію. Екстракт мучниці проявляє також в'яжучу, помірну болезаспокійливу і жовчогінну дію.
Екстракт хвоща містить комплекс біологічно активних речовин (в т.ч. кремнієву кислоту, сапоніни, дубильні речовини, органічні кислоти, солі), забезпечує сечогінний, протизапальний, кровоспинний, протимікробний, дезінтоксикаційний (виводить свинець) ефекти. У сечі кремнієві солі утворюють колоїди, що перешкоджають кристалізації сечових конкрементів.
Екстракт пол-пали – засіб рослинного походження, який одержують з трави ерви шерстистої або пол-пали (*Aerva Lanata L.*). Трава пол-пали містить в своєму складі алкалоїди ервін, метилервін, пектинові речовини, похідні олеанолової кислоти, феруloіламіди, флавоноїди, фенольні кислоти, солі калію та інші біологічно активні речовини. Пол-пали екстракт має знезаражуючу і сечогінну дію, сприяє виведенню піску з нирок і розчиненню каменів, очищає сечовий та жовчний міхури, виводить з організму радіонукліди, нормалізує процес обміну речовин в організмі.
Екстракт журавлини, що входить до складу УРОЛІКУ містить бензойну кислоту, яка підсилює дію антибіотиків і сульфаніламідів. У журавлині містяться лимонна, хінна, бензойна і олеїнова кислоти, вітаміни С і Р, каротин, сапоніни, амінокислоти, рутин, кверцитин, глікозид, мікроелементи (йод, залізо, мідь, марганець). Журавлиний танін має особливу здатність злипатися з різними хвороботворними бактеріями і виводити їх з сечею назовні. Журавлина також має протизапальні властивості при інфекції сечостатевих шляхів і циститах.

Застосування
Для профілактики та лікування собак та котів в складі комплексної терапії за:
- сечокам'яної хвороби;
- захворювань нирок (гломерулонефрит, інтерстиціальний нефрит, пієліт, пієлонефрит, ниркової недостатності);
- захворювань сечовидільної системи (цистит, неспецифічний уретрит, урологічний синдром).
Призначають собакам і котам з метою зниження рівня pH в сечі і виведення кристалів з сечових шляхів завдяки легкому сечогінному ефекту препарату. Особливо рекомендується тваринам з підвищеним ризиком захворюваності – кастрованим, стерилізованим, малорухливим, гладким.

Дозування
Перед застосуванням збовтати. Для профілактики препарат слід застосовувати перорально у дозі 1 мл препарату на 10 кг маси тіла тварини 2 рази на добу протягом 5–7 діб. Курс повторювати кожні 3–4 місяці.
Для комплексної терапії тварин при урологічному синдромі або початковій стадії сечокам'яної хвороби препарат рекомендується вводити в дозі 2–4 мл на 10 кг маси тіла тварини, перорально 2 рази на добу протягом 5–7 діб. Лікування необхідно поєднувати із застосуванням симптоматичних засобів та антибіотикотерапією.

Протипоказання
Підвищена індивідуальна чутливість тварини до компонентів, гостра ниркова недостатність, виразка шлунку (за призначенням лікаря ветеринарної медицини).

Застереження
Побічна дія
При дотриманні вказаних дозувань та умов введення препарат не викликає побічної дії.
Особливі застереження при використанні
При підвищеній індивідуальній чутливості тварини до компонентів лікарського препарату та появі побічних реакцій використання препарату припиняють та проводять десенсибілізуючу або симптоматичну терапію.
Використання під час вагітності, лактації.
З обережністю призначати вагітним та лактуючим тваринам, під наглядом лікаря ветеринарної медицини.

Форма випуску
Флакони з полімерних матеріалів по 50 мл та по 100 мл, укомплектовані шприцом-дозатором, вкладений в картонну пачку з інструкцією.

Зберігання
У сухому темному та недоступному для дітей місці за температури від 2 до 25 °С.
Термін придатності – 2 роки.
Термін придатності після першого відкривання флакону – не більше 21 доби при дотриманні умов зберігання.

Для застосування у ветеринарній медицині!

Власник реєстраційного посвідчення
ТОВ «ВП «Укрзооветпромпостач»
вул. Кавказька, 1, с. Плахтянка,
Бучанський р-н, Київська обл., 08030, Україна,
www.ukrzoovet.com.ua

Виробники:
ТОВ «ВП «Укрзооветпромпостач»
вул. Кавказька, 1, с. Плахтянка,
Бучанський р-н, Київська обл., 08030, Україна,
www.ukrzoovet.com.ua

AnigoVet